



partenaire au travail

Premiers Secours

- Rester calme et limiter les risques (couper électricité, gaz, machine, ...)
- Prévenir le secouriste de l'entreprise s'il y en a un et/ou les autres salariés.
- Eviter le sur accident.
- Alerter le SAMU 15 en décrivant la situation et en donnant l'adresse complète et précise de l'accident.
- Si saignement : comprimer la plaie avec la paume de la main (en se protégeant avec gant ou linge propre si possible)
- S'il y a un corps étranger dans la trachée avec suffocation : pratiquer 5 claques dans le dos (entre les omoplates) avant d'alerter.
- Mettre la victime en Position latérale de Sécurité. Ne pas déplacer la victime

Perte de Connaissance

- Allonger la personne ou semi-assise au sol si consciente
- dégrafer ses vêtements
- Position latérale de sécurité si inconsciente
- Ne pas faire boire
 APPELER LE 15

Faire le 15 +++
en cas de blesssure et
de saignement important

Plaies

PLAIE IMPORTANTE :

Pas de saignement important :

- ⇒ Eviter le contact avec du matériel non propre, appliquer un pansement ou un paquet de compresses sans en toucher la face intérieure.
- ⇒Quand les saignements cessent, fixer la compresse à l'aide d'un bandage en maintenant une bonne pression
- Ne jamais soulever la compresse pour «vérifier l'état de la blessure»
- ➡Elever le membre blessé au dessus du niveau du coeur.

Saignement important:

- ⇒Comprimer immédiatement :
- compression manuelle si il n'y a pas présence de corps étranger avec la paume de la main ou avec 1 pansement compressif
- compression à distance en cas de présence d'un corps étranger ou de fracture qui saigne.
- ⇒Jamais de garrot sauf en cas extrême

BLESSURES OCULAIRES :

- ⇒Appliquer 2 compresses de gaze ou de tissu sur les deux yeux.
- ⇒ Ne pas tenter d'enlever ou de déplacer l'objet incrusté dans l'oeil.
- PLAIES SUPERFICIELLES ET ECORCHURES :
- □ Lavez-vous les mains
- Réaliser le nettoyage de la plaie à l'eau à l'eau savonneuse puis désinfecter.
- ⇒Pansement adhésif.

PIOURES D'INSECTES :

- ⇒Si la victime a une réaction allergique violente, appeler le 15 (ou le 112 pour les portables) sans attendre.
- ⇒Pour les piqûres mineures, retirer la partie visible du dard ou de l'aiguillon avec précaution et désinfecter.
- ➡Mettre un pansement stérile.
- ⇒ Surveiller pendant 30 minutes le blessé : si malaise = appeler le 15 après avoir suivi la procédure «PREMIERS SECOURS».

Membre sectionné

SECTION COMPLETE DES DOIGTS OU DES MAINS :

- ⇒Envelopper l'extrémité amputée dans un pansemenet compressif puis surélever le membre.
- ⇒ Mettre le(s) segment(s) sectionné(s) aussitôt dans une compresse puis dans un sac en plastique à fermer hermétiquement et à conserver entre 5 et 15°C: utiliser le kit "section de membre" ou un récipient contenant des glaçons et de l'eau. Identifier le sac.
- ⇒ NE JAMAIS PLACER LE(S) SEGMENT(S) SECTIONNÉ(S) DIRECTEMENT SUR LES GLACONS.
- ⇒JAMAIS DE GARROT SAUF EN CAS EXTRÊME.

SECTION PARTIELLE DES DOIGTS OU DES MAINS :

➡ Immobiliser la main de la victime afin de la soulager et l'envelopper ensuite avec un pansement compressif, puis, si possible, surélever la main.

APPELER LE 15

Traumatisme

- Ne pas bouger la personne sauf si inconsciente (position latérale de sécurité du côté de la blessure ou suspicion de fracture)
- La couvrir.
- Ne pas fa faire boire

APPELER LE 15

Toujours penser à vérifier les vaccinations anti-tétaniques

Brûlure

- AGIR SUR LA CAUSE :
- ⇒Eteindre les flammes, couper le courant électrique, faites baliser la zone contaiminée par le produit chimqiue
- ➡Retirer le blessé de la zone accidentée en tenant compte des traumatismes possibles
- REFROIDIR LES ZONES BRÛLÉES POUR NEUTRALISER L'EFFET DE CHALEUR:
- ⇒Brûlures étendues :
 - Allonger le blessé
 - Utiliser de l'eau pendant 5 mn à 15°C
 - Couvrir les autres parties du corps de la victime afin d'éviter l'hypothermie du blessé
 - Si le corps entier doit être arrosé, moduler la température de l'eau afin qu'elle soit supportable pour la victime tout en refroidissant la brûlure.
- ⇒Petites brûlures peu étendues :
 - Utiliser de l'eau pendant 10 à 15 m,
- Désinfecter puis protéger par un pansement stérile
- RINCER LES ZONES CONTAMINEES
 POUR NEUTRALISER L'EFFET DU
 PRODUIT CHIMIQUE:
- ⇒ Projection de produit chimique
 - Utiliser de l'eau pendant 20 mn à température ambiante (tiède si possible) afin d'éviter l'hypothermie du blessé
 - Faire déshabiller la victime du haut vers le bas afin de retirer les vêtements imprégnés de produit sans oublier les chaussures.
 - Préparer la Fiche de Données de Sécurité du produit en cause et la donner aux secours extérieurs.
- ➡ Projection de produit chimique dans les yeux :
 - Maintenir les paupières écartées et laver à grande eau aussitôt, pendant 15 mn en rinçant également sous les paupières.
 - Protéger l'autre oeil des projections d'eau contaminée.
 - Appliquer un pansement oculaire.
 - Préparer la Fiche de Données de Sécurité du produit en cause.

APPELER LE 15